

Anafylaxi på BVC - akuta åtgärder

- **Ge adrenalin**, intramuskulärt i låret. Upprepa var femte minut vid behov.
- **Larma 112.**
- Kontrollera andning och cirkulation.
- Behandla bronkobstruktion om barnet har astma.
- Ge antihistamin om barnet kan svälja säkert.
- Övervaka barnet i väntan på ambulanstransport.

Vid livlöshet, återuppliva enligt handlingsplan för [S-HLR Barn](#).

ADRENALIN

Barnets vikt	Autoinjektor	Effekt
<20 kg	0,15mg i.m *	inom 5 min, kan upprepas var 5:e min
≥20 kg	0,3mg i.m (2 st 0,15mg)	inom 5 min, kan upprepas var 5:e min

*Gäller även barn <7,5 kg vid livshotande tillstånd.

Antihistamin	Dosering	Effekt
Tablett Desloratadin 2,5 mg eller lösning 0,5 mg/ml	2,5 mg (1 tabl alt. 5 ml) per os *	Effekt inom 60 min

*Gäller för barn 1 månad till 5 år.

Sjuksköterska: får ge läkemedel enligt detta PM.

Medicinskt ansvarig:

.....

Datum och giltighetstid:

.....

På [Rikshandboken i barnhälsovård](#) finns fördjupad information om anafylaxi på BVC.